



ワクチン		種類	乳児期										幼児期					学童期／思春期													
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上							
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②					③	(注1)																			
	母子感染予防		①	②					③																						
ロタウイルス	1価	生			①	②	(注2)																								
	5価				①	②	③	(注3)																							
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化			①	②	③				④						(注4)														
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③				④			7.5歳まで					15歳未満まで使用可能												
3種混合（DPT）		不活化													① (注5)								② 11-12歳 (注6)								
2種混合（DT）		不活化																								① 11歳		12歳			
ポリオ（IPV）		不活化													① (注7)																
インフルエンザ菌 b 型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③				④								(注8)												
4種混合（DPT-IPV） ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③				④			7.5歳まで					15歳未満まで使用可能												
BCG		生						①																							
麻疹・風疹混合（MR）		生									①					② (注9)															
水痘		生									①		②		(注10)																
おたふくかぜ		生									①						② (注11)														
日本脳炎		不活化						生後6か月から接種可能					① ②		③	7.5歳まで			④ 9-12歳												
不活化インフルエンザ		不活化						生後6か月から接種可能					毎年（10、11月などに）① ②										13歳以上①								
経鼻弱毒生インフルエンザ		生												2歳以上～19歳未満に 毎年（10月、11月などに）① 点鼻																	
新型コロナ		mRNA	製剤により使用できる年齢が異なる																												
		不活化																													
ヒトパピローマウイルス（HPV）	9価	不活化																			(注12)	小6	中1① ② (注13)		中2～高1相当	(注14)					
	2価・4価	不活化																			(注12)	小6	中1 ① ② ③ (注13)		中2～高1相当	(注14)					
ワクチン		種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上							